



Асоціація кардіологів України
Асоціація аритмологів України
Асоціація дослідників України
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології
імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України»
Департамент охорони здоров'я



Львівської обласної державної адміністрації
Робоча група з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України

Майстер-клас

ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ХВОРОГО З МИГОТЛИВОЮ АРИТМІЄЮ



Запрошення і програма

18 листопада 2015 року
м. Львів

Почесний голова: Президент Асоціації кардіологів України, директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, академік НАМН України, професор **Коваленко Володимир Миколайович**

Модератори конференції: Президент Асоціації аритмологів України, завідувач відділу аритмій серця ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, д.м.н., професор **Сичов Олег Сергійович**
Головний кардіолог Львівської області
Павлик Степан Степанович

Вельмишановний (а) _____ !

Запрошуємо Вас взяти участь у майстер-класі «Тактика ведення хворого з миготливою аритмією», в ході якого будуть прочитані лекції провідних спеціалістів з питань клінічної аритмології, обговорені питання діагностики, лікування та попередження ускладнень фібриляції та тріпотіння передсердь з огляду на останні рекомендації Європейського товариства кардіологів (2010–2015 рр.), Асоціації кардіологів України та Асоціації аритмологів України.

Конференція проводиться за ініціативою Асоціації аритмологів України та Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України та Департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації. Майстер-клас розрахований на кардіологів, терапевтів, лікарів загальної практики, невропатологів та лікарів інших спеціальностей.

Після завершення майстер-класу всі зареєстровані учасники отримають сертифікати затвердженого зразка.

Майстер-клас розпочнеться 18 листопада 2015 року о 10.00.

Адреса: м. Львів, вул. Матейка, 6,

Готель «Дністер», конференц-зал «Львівський», 2-й поверх.

Реєстрація учасників з 9-30 у фойє.

Секретар конференції: Ст.н.с. Л.Л. Вавілова.

Генеральний партнер: BAYER (Німеччина).

Офіційні партнери: ТОВ «САНОФІ-АВЕНТИС Україна», BOEHRINGER INGELHEIM (Німеччина), OLFA (Україна), КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД (Україна), ABBOTT (США), TAKEDA (Японія), MEDTRONIC (США), MEDOCHEMI (Кіпр), BERLIN-CHEMIE (Німеччина), БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМФАРМЗАВОД (Україна).

10.00 Відкриття майстер-класу

Президія: проф. Сичов Олег Сергійович,
головний терапевт Парфенюк Оксана Миронівна,
головний кардіолог Павлик Степан Степанович

Вступне слово:
головний кардіолог Павлик Степан Степанович

10.10 – 12.30

1. Розвиток інвазивної аритмології в Україні – 20 хв.

Академік НАМН України Коваленко Володимир Миколайович
Професор Сичов Олег Сергійович (Київ)

2. Лекція «Доповнення 2013–2014 рр. до рекомендацій щодо ведення хворих з фібриляцією передсердь» – 40 хв.

Професор Сичов Олег Сергійович (Київ)

3. Відновлення синусового ритму у хворих з фібриляцією передсердь – 20 хв.

Д.м.н. Іркін Олег Ігоревич (Київ)

4. Підходи до лікування фібриляції передсердь у різних клінічних ситуаціях – 20 хв.

Ст.н.с. Романова Олена Миколаївна (Київ)

5. Антитромботична терапія при миготливій аритмії – 20 хв.

Д.м.н. Ханюков Олексій Олександрович (Дніпропетровськ)

6. Європейські рекомендації щодо застосування імплантованих пристроїв (ЕКС, ІКД, СРТ) у лікуванні аритмій і ХСН. Показання до імплантації (інтерактив) – 20 хв.

Зав. лаб. Лизогуб Сергій Володимирович (Київ)

12.30 – 13.00 Відповіді на запитання. Вручення сертифікатів.

Профілактика інсульту та системної емболії у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь*



Science For A Better Life

Ксарелто® – ефективна та зручна профілактика інсульту та системної тромбоемболії**1-3

При застосуванні Ксарелто® (ривароксабан) порівняно з варфарином:

На 31% нижчий відносний ризик крововиливів у життєво важливі органи⁴

На 50% нижчий відносний ризик фатальних кровотеч^{**4}

Зручна профілактика – лише одна таблетка один раз на добу, що не потребує рутинного моніторингу³

КСАРЕЛТО®: Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 15 мг або 20 мг. 1 таблетка, вкриті плівковою оболонкою, містить 15 мг ривароксабану; 1 таблетка, вкриті плівковою оболонкою, містить 20 мг ривароксабану; Бульбаска, завернута у фольгу. Більш детальна інформація викладена в інструкції для медичного застосування препарату, також її можна отримати в ТОВ «Байер».

Показання: Профілактика інсульту та системної емболії у дорослих пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь та одним чи кількома факторами ризику, такими як застійна серцева недостатність, артеріальна гіпертензія, вік ≥ 75 років, цукровий діабет, інсульт або транзиторна ішемічна атака в анамнезі. Лікування тромбозу глибоких вен (ТГВ), тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) і профілактика рецидивуючого ТГВ та ТЕЛА у дорослих (див. розділ «Особливості застосування» стосовно пацієнтів з ТЕЛА, що мають нестабільні гемодинамічні показники).

Протипоказання: Підвищена чутливість до ривароксабану або до будь-яких допоміжних речовин препарату; клінічно значуща активна кровотеча; ушкодження або стан, що супроводжується значним ризиком розвитку кровотеч, до яких належать: наявні на даний час або нещодавно діагностовані виразки шлунково-кишкового тракту, зльовісні пухлини з високим ризиком кровотеч, нещодавно перенесена травма головного або спинного мозку, нещодавно перенесене оперативне втручання на головному, спинному мозку або очі, нещодавно внутрішньочерепний крововилив, варикозне розширення вен стравоходу (виявлене чи підозрюване), артеріовенні мальформації, анемія; судини або значні за розміром внутрішньочерепні або внутрішньочерепні судинні змозки; одночасне застосування з будь-якими іншими антикоагулянтами, зокрема з нефракціонованим гепарином, низькомолекулярними гепаринами (еноксапарин, дальтепарин і т.п.), підкожними гепаринами (фіонапарин і т.п.), пероральними антикоагулянтами (варфарин, апіксабан, дабігатран і т.п.), окрім випадків переходу з або на терапію ривароксабаном (див. розділ «Спосіб застосування та дози») або коли нефракціонований гепарин протипоказаний у дозах, необхідних для функціонування відкритого катетера центральної вени або артерії; захворювання печінки, які асоціюються з коагулопатією та клінічно значущим ризиком розвитку кровотеч¹, у тому числі цироз печінки класу B та C (за класифікацією Чайлда-П'ю); діти віком до 18 років; період вагітності або годування груддю.

Побічні реакції зафіксовані на тлі прийому: часті (частота від $\geq 1/100$ до $\leq 1/10$) – анемія (включаючи відповідні лабораторні параметри), тахікардія, очні крововиливи (включаючи крововиливи у кон'юнктиву), шлунково-кишкові кровотечі (включаючи кровотечі з жовч і ректальну кровотечу), біль у животі та шлунково-кишковому тракті, диспепсія, нудота, запор, діарея, блювота, гарячка, периферичний набряк, загальне погіршення самопочуття та зниження активності (включаючи астмію), постпроцедурна кровотеча (включаючи післяопераційну анемію та кровотечі з ран), синці, секрети з ран, підвищення рівня трансаміназ, біль у кінцівках, запаморочення, головний біль, ургентальні кровотечі (включаючи гематурию і меноррагію), порушення функції нирок (включаючи підвищення рівня креатиніну в крові, підвищення рівня сечовини в крові), носова кровотеча, кровоохаркани, сербб (включаючи нечасті випадки генералізованого серббу), висипання, екзіма, шкрябані та підшкірні крововиливи, артеріальна гіпотензія, гематома. Детальна інформація про можливі побічні реакції міститься в інструкції для медичного застосування препарату. Рестраційне свідоцтво: Ксарелто 15 мг МОЗ України ІЧУА/9201/01/02 від 12.11.2013 Наказ МОЗ №958; Ксарелто 20 мг МОЗ України ІЧУА/9201/01/02 від 12.11.2013 Наказ МОЗ №958.

Дата останнього перегляду інструкції – 12.11.2013. Відгукається за рецептом.

«Інформація про лікарський засіб. Інформація призначена для медичних та фармацевтичних працівників»

1. Рекомендації робочої групи по порушенням серцевого ритму Асоціації кардіологів України, «Діагностика та лікування фібриляції передсердь. Антикоагулянтна терапія». О.С. Сичов, та ін. Київ-2013. 2. "2012. focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation" J. Camm, et al. European Heart Journal (2012) 33, 2719–2747. 3. EHRA PRACTICAL GUIDE: "European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of new oral anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation" Hein Heidrich et al. Europace (2013) 15, 625–651. 4. A ROCKET AF Investigators. Rivaroxaban versus Warfarin in Nonvalvular Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2011, published on Aug 10, 2011, at NEJM.org

* – інформація про лікарський засіб.

** – загальна частота кровотеч була зрівняною в обох групах.

ТОВ «Байер»: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 4-Б.
Тел.: (044) 224-33-00; факс: 220-33-01. www.bayer.ua

Ксарелто®
РИВАРОКСАБАН